



أعراض المرض:

- معظم الحالات تحدث بدون أعراض خاصة في فترة الطفولة .
- قد تظهر بعض الأعراض على شكل أنفلونزا (حمى، قشعريرة) مصحوبة بفقدان شهية وغثيان وألم في البطن واضطراب معوي .
- بعد عدة أيام تبدأ مرحلة الاصفار بالجلد والعيون، ويتحول البول إلى اللون الغامق كلون الشاي، ويتحول البراز إلى اللون الفاتح وقد تستمر الأعراض لمدة شهر .
- تعقب هذه المرحلة مرحلة الشفاء التي قد تستغرق أسابيع تمتَّد إلى ٦ أشهر أحياناً. يستمر بها تضخم الكبد .
- التهاب الكبد الوبائي آ لا يتحول إلى مرض مزمن. وقد يحدث انتكاسة مرضية عند ٢٠٪ من المرضى بعد شفائهم . هذه الإنكاستة تضعف المريض لمدة ١٥ شهر تقريباً .
- ونسبة الوفاة أقل من ١٪ من المرضى ، وتكون المضاعفات عند الأطفال أقل شدة .
- يتكون عند المرضى مناعة ضد المرض تبقى مدى الحياة أي لا يصاب المريض مرة أخرى بهذا المرض .

تعريف التهاب الكبد الانتاني أ

هو مرض فيروسي يصيب الكبد بالتهاب حاد ومعظم الإصابات تحدث أثناء فترة الطفولة وتكون خفيفة ، ولكن قد تحدث في أي عمر إذا لم يصب به الإنسان من قبل. و يحدث المرض في الأماكن التي يتداوى فيها مستوى النظافة وهو شديد العدوى .


طرق انتقال المرض:

يوجد الفيروس بكميات كبيرة في براز المصابين بالتهاب الكبد الوبائي آ في فترة ما قبل ظهور الأعراض وحتى أسبوع بعد ظهور اليرقان . تنتقل العدوى عن طريق الفم بواسطة:

- تلوث الأيدي ببراز شخص مصاب.
- تلوث مياه الشرب بالفضلات الآدمية عن طريق الصرف الصحي .
- تلوث الأطعمة والمشروبات بواسطة الذباب
- أو الأيدي الملوثة ببراز المصاب.
- تناول الخضراوات المروية بمياه الصرف الصحي .



التهاب الكبد الانتاني آ **(اليرقان)**



طرق الوقاية:

يمكن تجنب الإصابة بمرض التهاب الكبد باتباع التالي :

- بالمحافظة على النظافة الشخصية والملابس والمسكن .
- غسل الأيدي جيداً قبل تحضير الطعام وقبل تناوله .
- عدم استعمال أدوات المريض والاهمام بتعقيمها .
- التخلص من فضلات المريض بأكياس خاصة وسكب المطهر فوق سلة المهملات .
- غسل الخضروات بشكل جيد بالماء النظيف والصابون ، وطهي الطعام جيداً، فالفيروس يتم موته عند تعرضه لحرارة الطبخ .
- عدم تناول الأطعمة المكشوفة المعروضة للتلوث والحشرات (مثل الذباب) .
- التأكد من سلامة مياه الشرب وعند الشك يجب غلي الماء قبل الاستعمال .



هل يوجد علاج للمرض؟

- يشفي المرض لوحده ولا يحتاج المريض إلى علاج خاص ولكن ينصح باتباع الآتي:
- أخذ قسط من الراحة .
 - الإكثار من تناول السوائل والفاكهه الطازجه والعسل والمربيات ، وتنقيل الأطعمة الدسمة .
 - يمكن استخدام المسكنات مثل باراسيتامول لتخفيف الحرارة وتسكين الألم .
 - لا يشترط عزل المريض بالمستشفى ويمكن متابعة العلاج في المنزل إذا كانت حالته الصحية غير خطيرة . ويجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم الحمام بشكل دائم .



فترة حضانة المرض:

- يظهر المرض واليرقان عند المصاب بعد فترة تمتد من ٤ – ٦ أسابيع من وقت التعرض للعدوى .
- يبقى المريض معدياً للأخرين مدة ثلاثة أسابيع من بداية الأعراض .

تشخيص المرض:

- يتم تشخيص المرض بالفحص الطبي وخاصة عند ملاحظة الأعراض عند عدد من أفراد الأسرة أو مجموعة من الناس .
- ويتم تأكيد المرض مخبرياً بتحليل الدم .

